

Patiënt instructie studiemedicatie PERSuaDER studie

Hierbij vindt u informatie over het gebruik van de PERSuaDER studiemedicatie.

Hoe ziet de studiemedicatie eruit en wat zit er in een verpakking?

De antibiotica- en antischimmeldrank wordt geleverd in twee doosjes. In elk doosje zitten twee verschillende flesjes en een doseerspuitje:

- Flesje 1 (*het bruine flesje met de oranje melkachtige vloeistof*): bevat de antischimmeldrank, te weten 40 ml Fungizone drank op dit flesje staat "Fungizone 100 mg/ml suspensie voor oraal gebruik" (met als werkzame stof Amfotericine B).
- Flesje 2 (*het doorzichtige flesje met de heldere vloeistof*): bevat de antibioticadrink, te weten 40 ml Basis voor SDD drank, op dit flesje staat "Basis voor SDD suspensie" (met als werkzame stoffen Tobramycine en Colistine).

Let op: alleen gebruiken als deze vloeistof helder is.

In de week rondom uw operatie dient u uit beide flesjes vier maal daags 5 ml drank in te nemen. Waarbij u altijd start met de inname van de Fungizone drank (het bruine flesje).

Innemen van de antibioticadrinkjes

Stap 1: Schud beide flesjes voor gebruik rustig, maar goed om. Let op: schud niet te hard. Hierdoor ontstaan er luchtbellens en kunt u de studiemedicatie minder goed opzuigen met de spuit.


Stap 2: Verwijder de dop van de doseerspuit.

Stap 3: Open het bruine flesje met de Fungizone drank.

Stap 4: plaats het koppelstukje in de hals van het flesje met de Fungizone drank.



Stap 5: Meet 5 mL af van de Fungizone drank met behulp van de meegeleverde doseerspuit. Dit kunt u doen door de doseerspuit in de opening van het koppelstukje te plaatsen en 5 mL op te trekken in de doseerspuit.



Stap 6: Neem de 5 mL Fungizone drank via de mond in door het spuitje in uw mond leeg te spuiten en slik deze door.

Stap 7: Sluit het flesje af, laat hierbij het koppelstukje zitten.

Stap 8: Spoel het spuitje af onder de kraan.

Stap 9: Open vervolgens het tweede flesje met de basis voor SDD drank. (het doorzichtige flesje)

Stap 10: Meet 5 mL af met behulp van de meegeleverde doseerspuit. Dit kunt u doen door de doseerspuit in de daarvoor bestemde opening van de dop te plaatsen. Keer het flesje vervolgens om en trek 5 mL op in de doseerspuit.

Stap 11: Neem de 5 mL basis voor SDD drank via de mond in door het spuitje in uw mond leeg te spuiten en slik deze door.

Stap 12: Sluit het flesje af.

Stap 13: Spoel het spuitje af onder de kraan.

Stap 14: Berg alles op in de verpakking.

Stap 15: Noteer de innametijd en het ingenomen aantal mL van beide drankjes in uw patiëntdagboek en beantwoord aan het eind van de dag de overige vragen die in het dagboekje gesteld worden.

Dosering studiemedicatie:

- Gedurende de drie dagen voordat u geopereerd wordt neemt u: 4 maal daags 5 ml van beide drankjes in via de mond. Neem de beide drankjes rond de volgende tijden in: 08.00 uur, 12.00 uur, 18.00 uur en 22.00 uur.
- De dag van de operatie neemt u alleen 's ochtends en in de late avond een dosering van 5 ml van beide drankjes.
- De drie dagen nadat u geopereerd bent neemt u weer 4 maal daags 5 ml van beide drankjes.

Dag -3	Dag -2	Dag -1	Dag van operatie	Dag +1	Dag +2	Dag +3
<u>4 keer</u> 08:00 uur 12:00 uur 18:00 uur 22:00 uur	<u>4 keer</u> 08:00 uur 12:00 uur 18:00 uur 22:00 uur	<u>4 keer</u> 08:00 uur 12:00 uur 18:00 uur 22:00 uur	<u>2 keer</u> 1 dosis ochtend vóór operatie 1 dosis avond ná operatie	<u>4 keer</u> 08:00 uur 12:00 uur 18:00 uur 22:00 uur	<u>4 keer</u> 08:00 uur 12:00 uur 18:00 uur 22:00 uur	<u>4 keer</u> 08:00 uur 12:00 uur 18:00 uur 22:00 uur

Welke medicatie mag u niet nemen tijdens het gebruik van de studie medicatie?

Sucralfaat, dit verminderd de werkzaamheid van de studiemedicatie.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u per ongeluk te veel van (een van) de drankjes heeft ingenomen, neem dan contact op met uw behandelend arts voor advies.

Bent u dosis vergeten in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Noteer in uw patiëntdagboekje dat u een dosis bent vergeten in te nemen.

Als u stopt met het gebruik van deze middelen:

U mag elk moment besluiten om te stoppen met het innemen van de drankjes. Wel willen we u dan vragen om dit meteen bij uw behandelend arts te melden en in uw dagboekje te noteren.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C, niet in de koelkast of vriezer.

De drankjes in de oorspronkelijke verpakking, ter bescherming tegen licht, bewaren bij kamertemperatuur.

Let op: bewaar buiten het bereik van kinderen.

Wij vragen u om zowel lege flesjes als de flesjes met de overgebleven inhoud in te leveren bij de verpleegkundige op de afdeling waar u wordt opgenomen voor uw slokdarmoperatie.

Voor aanvullende informatie verwijzen we u naar de bijsluiter. Indien u nog aanvullende vragen heeft kunt u altijd contact opnemen met het onderzoeksteam via:

Email: persuader.heel@radboudumc.nl

Telefoon: 06 55 74 03 13